

Fiziksel Muayene Becerilerinin Geliştirilmesinde Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Kullanımına Yönelik Hemşirelik Öğrencilerinin Görüşleri

Ayşe Demiray^{ID}, Selin Keskin Kızıltepe^{ID}, Nagihan İlaslan^{ID}, Ayşegül Açıl^{ID}

Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye

Ayşe Demiray, Dr. Öğr. Üyesi
Selin Keskin Kızıltepe, Öğr. Gör. Dr
Nagihan İlaslan, Araş. Gör.
Ayşegül Açıl, Araş. Gör.

İletişim:

Araş. Gör. Nagihan İlaslan
Düzce Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü, Düzce, Türkiye
Tel: +90 380 542 11 41
E-Posta: nagihan-bitik@windowslive.com

Gönderilme Tarihi : 10 Eylül 2018
Revizyon Tarihi : 01 Ekim 2018
Kabul Tarihi : 10 Ekim 2018

ÖZET

Giriş: Öğrencilerin kazanmaları beklenen fiziksel muayene becerileri hemşirelik eğitiminin temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Çalışmanın amacı; Fiziksel Muayene Dersi uygulamasında akciğer, bağırsak ve kalp sesleri dinleme becerilerini yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülasyon ile gerçekleştiren hemşirelik öğrencilerinin simülasyon uygulamasına yönelik görüşlerini değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan çalışma Fiziksel Muayene Dersi'ni alan 156 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu", "Uygulamaya Yönelik Görüş Formu" kullanılarak toplanmıştır. Nicel veriler ortalama, standart sapma, ortanca, frekans şeklinde sunulmuştur. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Verilerin analizinde öğrencilerin %58,3'ü Fiziksel Muayene Dersi'nin teorik ders saatini yeterli, %63,5'i uygulamanın gerçekleştirildiği ortamı uygun, %53,2'si uygulama için kullanılan simülasyonu etkili ve yeterli ve %71,2'si uygulamalar sırasında öğretim elemanının desteğini yeterli olarak belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin %64,7'si uygulamalarda kullanılan simülasyonda akciğer seslerini, %51,3'ü bağırsak seslerini, %71,8'i kalp seslerini rahatça duyabildiğini, %46,2'si akciğer seslerini rahatça ayırt edebildiğini ve %51,9'u simülasyonda uygulama yapmanın gerçekmiş gibi hissettirdiğini belirtmiştir. Yine öğrencilerin %21,2'sinin simülasyon kullanımını "gerçeğe yakın, uygun" olarak belirtmişlerdir.

Sonuç: Fiziksel muayene becerileri açısından donanımlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla ders uygulamalarına gerçeklik düzeyi yüksek simülasyonlar, öğrencilerin bilgi ve beceri entegrasyonunu geliştirecek simülasyon senaryoları dahil edilmelidir.

Anahtar sözcükler: Hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, fiziksel muayene, simülasyon

NURSING STUDENTS' VIEWS TOWARDS THE USE OF HIGH FIDELITY SIMULATION IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EXAMINATION SKILLS

ABSTRACT

Introduction: The physical examination skills of students are considered as one of the basic components of nursing education. The purpose of this study is to evaluate the nursing students' views about simulation applications who practice the sounds of the lung, intestine and heart sounds with high fidelity simulator.

Materials and methods: A total of 191 nursing students who took the Physical Examination Course in the descriptive type of study were targeted, but 156 students participated. The data were collected by using the "Personal Information Form" and "Opinion Form About Practice" prepared by the researchers. Quantitative data are presented as mean, standard deviation, median and frequency. Mann-Whitney U test was used in the analysis of the data.

Results: 58,3% of the students were satisfied with the theoretical hours of the Physical Examination lessons, 63,5% found the practice environment appropriate, 53,2% found the simulator effective and sufficient, 71,2% stated that the support of the lecturer was adequate during the applications. It was also found that in the simulator used in practice, 64,7% of students had heard lung sounds, 51,3% had heard intestinal sounds, and 71,8% had heard heart sounds easily; 46,2% stated that they distinguished the lung sounds easily and 51,9% felt that it was realistic. Again, 21,2% of them stated that the use of the simulator is "close to reality".

Conclusion: In order to train and equip students with physical examination skills, high fidelity simulators and scenarios that will develop the knowledge-skill integration of the students should be included in the courses.

Keywords: Nursing, nursing students, physical examination, simulation

Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte ortaya çıkan hızlı değişimler sağlık alanına ve sağlık bakım ortamlarına yenilikçi yaklaşımlar getirmektedir. Bu durum bilgi ve psikomotor becerinin entegrasyonunu kapsayan hemşirelik eğitiminde, interaktif ve güncel öğretim tekniklerini gerektirmektedir (1,2). Yapararak öğrenmeyi gerektiren psikomotor beceri kazanımı sürecinde yeterli düzeyde gelişmeyen beceriler ile klinik alanda deneyim kazanmaya çalışmak hasta güvenliği ve hasta hakları açısından risk oluşturabilmekte ve öğrencilerin klinik beceri gelişimlerini sınırlandırabilmektedir (3).

Temel amaçlarından biri hasta bakımını geliştirmek ve hasta güvenliğinin sağlanması amacıyla yetkin hemşireler yetiştirmek olan hemşirelik eğitiminde (4), hemşirelik becerilerinin gelişimi açısından klinik ortamlardan ziyade, ilk basamak olarak kullanılan hemşirelik beceri laboratuvarlarında yenilikçi öğretim metotlarının kullanımı artan bir öneme sahiptir (4,5). İnteraktif yöntemlerden biri olan, eğitim sürecinde uzun yıllardır kullanılan ve kullanımı her geçen gün artan simülasyon tekniği ise gerçekçi, güvenli ve etkili bir öğrenme ortamı sunması dolayısıyla değerli bir öğretim stratejisidir (4,6). Simülasyona dayalı öğretim, hastaya zarar verme ihtimali olmayan ortamlarda öğrenciye tekrarlı uygulama yapma fırsatı, sahip olduğu bilgi ve becerileri değerlendirebilme imkanı sunmaktadır. Bilgi ve becerilerin optimal düzeyde geliştirilmesi hasta bakımındaki hataları ve eksikleri azaltmaktadır (7-9).

Simülasyona dayalı öğretim; rol play, standardize hastalar, sanal gerçeklik, düşük ya da yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülasyon gibi birçok farklı formata sahiptir. Düşük gerçeklik düzeyine sahip simülasyon tekniği durağan olup daha az gerçeklik sunabilirken, yüksek gerçeklikli simülasyon yöntemleri uygulamalara gerçek fizyolojik tepkiler verebilmekte ve maksimum düzeyde gerçeklik sunabilmektedir (10).

Literatür incelendiğinde simülasyona dayalı öğretim yönteminin öğrencilerin fiziksel muayene becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kullanıldığı ve anlamlı sonuçlar ortaya koyduğu görülmektedir (1,7,11). Öğrencilerin kazanmaları beklenen fiziksel muayene becerileri hemşirelik eğitim programlarının temel bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bütüncül hemşirelik bakımı hastaların fiziksel olarak değerlendirilmesi ve sağlık öykülerinin alınmasına dayalı olarak bakımın planlanması ve uygulanmasını gerektirmektedir (12).

Materyal ve metod

Araştırma türü ve amacı

Tanımlayıcı tipte yapılan çalışmanın amacı, Fiziksel Muayene Dersi'ni almış olan ikinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin akciğer, kalp ve bağırsak seslerini dinleme becerilerini yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülasyon ile gerçekleştirmelerine yönelik görüşlerini değerlendirmektir.

Araştırma evreni ve örnekleme

Araştırma evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 01/03/2018-01/06/2018 tarihleri arasında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi ikinci sınıfta öğrenim görmekte olan ve Fiziksel Muayene Dersi'ni alan toplam 191 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Evreni temsil edecek örneklem sayısı ise 191 öğrenciden %95 güven sınırında %5 kabul edilebilir hata ile 156 öğrenci olarak hesaplanmıştır.

Veri toplama araçları

Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan, öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini içeren "Kişisel Bilgi Formu" ve "Uygulama Yönelik Görüş Formu" kullanılarak toplanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin yaş, cinsiyet ve Fiziksel Muayene Dersi almadan önce akciğer, kalp ve bağırsak sesi dinleme eğitimi alıp almama ve eğer eğitim aldıysa nerede ve nasıl eğitim aldıklarına yönelik 3 adet sorudan oluşmaktadır.

Uygulamaya Yönelik Görüş Formu

Araştırmacılar tarafından hazırlanan "Uygulamaya Yönelik Görüş Formu", öğrencilerin Fiziksel Muayene Dersi kapsamında akciğer, kalp ve bağırsak sesleri dinleme becerilerini yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülasyon (Meti-Man Prehospital Simulator) ile gerçekleştirmelerine yönelik 3 adet açık uçlu sorudan oluşan 1. kısım ve "Hiç katılmıyorum", "Katılmıyorum", "Kararsızım" ve "Katılıyorum" seçeneklerinden birini işaretleyecekleri 11 adet soru içeren 2. kısımdan oluşmaktadır. Formun ikinci kısmından öğrenciler en az 11, en fazla 44 puan alabilmektedir.

Veri toplama

Veriler veri toplama formları kullanılarak, Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Katılımcıların veri toplama formlarını doldurabilmeleri için gereken süre 10-15 dakika arasındadır.

Araştırmanın etik yönü

Çalışmanın yapılabilmesi için çalışmanın gerçekleştirildiği üniversitenin Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan (Etik onay no: 2018/39) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanlığı'ndan yazılı izin alınmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olup, çalışmaya katılacak olan tüm öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş çalışmaya katılan öğrencilerden sözlü onam alınmıştır.

Verilerin Değerlendirilmesi

Veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Nicel veriler ortalama, standart sapma, ortanca (minimum-maksimum), frekans (yüzde) şeklinde sunulmuştur. Verilerin istatistiksel analizinde Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak alınmıştır.

Çalışmanın sınırlılıkları

Çalışma verileri sadece Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci sınıfta eğitim gören öğrencilerden elde edildiği için çalışma sonuçları Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.

Bulgular

Araştırma bulguları tanımlayıcı istatistikler ve öğrencilerin görüşlerine yönelik gerçekleştirilen analizler şeklinde aşağıda sunulmuştur.

Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının $20,36 \pm 1,29$ olduğu, %93,6 (n=146)'sının 19-21 yaş aralığında, %68,6 (n=107)'sının kadın olduğu, %94,2 (n=147)'sinin hemşirelik eğitimleri sürecinde Fiziksel Muayene Dersi almadan önce akciğer, kalp ve bağırsak sesi dinleme eğitimi almadıkları belirlenmiştir (Tablo 1). Bu konuda daha önce eğitim aldığını belirtenlerin %5,8 (n=9)'inin ise Sağlık Meslek Lisesi'nde eğitim aldığı saptanmıştır.

Çalışmaya katılan öğrencilerin %58,3 (n=91)'ü Fiziksel Muayene Dersi'nin teorik ders saatinin yeterli olduğunu, %34,6 (n=54)'sı laboratuvar uygulama saatinin yeterliliği konusunda kararsız olduğunu, %63,5 (n=99)'i uygulamanın gerçekleştirildiği ortamın uygun olduğunu, %53,2 (n=83)'si uygulama için kullanılan simülatörün etkili ve yeterli olduğunu ve %71,2 (n=111)'si uygulamalar sırasında öğretim elemanının öğrenciye verdiği desteğin yeterli olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin %64,7 (n=101)'i uygulamalarda kullanılan simülatörde akciğer seslerini rahatça duyabildiğini, %46,2 (n=72)'si akciğer

Tablo 1. Öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı (N=156)

		n	%
Yaş Grupları	19-21	146	93,6
	$\bar{x} \pm SS^{**} = 20,36 \pm 1,29$	22-27	10
Cinsiyet	Kadın	107	68,6
	Erkek	49	31,4
Eğitim Alma Durumu	Evet	9	5,8
	Hayır	147	94,2
Toplam		156	100

* \bar{x} : Aritmetik Ortalama, **S.S.: Standart Sapma

seslerini rahatça ayırt edebildiğini, %51,3 (n=80)'ü bağırsak seslerini rahatça duyabildiğini, %71,8 (n=112)'i kalp seslerini rahatça duyabildiğini, %51,9 (81)'u simülatörde uygulama yapmanın gerçekmiş gibi hissettirdiğini ve %62,8 (n=98)'i ise öğretim elemanı tarafından karışık olarak sunulan anormal akciğer seslerini ayırt ederek doğru şekilde cevap verebildiğini ifade etmiştir (Tablo 2).

Öğrencilerin Fiziksel Muayene Dersi ile ilgili görüşlerine yönelik maddelerinin madde puan ortalamaları Tablo 3'te verilmiştir. Öğrencilerin en yüksek puanı "Laboratuvar uygulamaları sırasında öğretim elemanının öğrenciye verdiği destek yeterliydi" ($3,60 \pm 0,72$), ve "Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde kalp seslerini rahatça duyabildim" ($3,60 \pm 0,72$), en düşük puanı ise "Fiziksel Muayene Dersi laboratuvar uygulama saati yeterliydi" ($2,44 \pm 1,00$) ifadelerinden aldıkları belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin Fiziksel Muayene Dersi ile ilgili görüşlerine yönelik maddelerin madde puan ortalamaları $2,44 \pm 1,00$ ile $3,60 \pm 0,72$ arasında değişmektedir (Tablo 3).

Öğrencilerin akciğer, bağırsak ve kalp seslerini dinleme becerileri için yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülatör kullanımına yönelik görüşleri incelendiğinde, çalışmaya katılan öğrencilerin %21,2 (n=33)'sinin simülatör kullanımının olumlu yönünü "gerçeğe yakın, uygun olması" olarak belirttiği, %35,3 (n=55)'ünün uygulamalarda simülatör kullanımının olumsuz bir yönünün olmadığını ifade ettiği ve %42,9 (67)'unun ise "uygulama saatinin artırılması" şeklinde öneride bulunduğu görülmüştür (Tablo 4).

Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile Fiziksel Muayene Dersi'ne yönelik görüşlerinin toplam puanları arasında yapılan analizlerde, öğrencilerin toplam puan ortalamalarının $38 \pm (19-44)$ olduğu ve tanımlayıcı özelliklerin öğrencilerin görüşleri üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir ($p > 0,05$) (Tablo 5).

Tablo 2. Öğrencilerin fiziksel muayene dersi ile ilgili görüşlerinin frekans dağılımları (N=156)

<i>Sorular</i>		<i>n</i>	<i>%</i>
Fiziksel Muayene Dersi teorik ders saati yeterliydi	Hiç katılmıyorum	11	7,1
	Katılmıyorum	22	14,1
	Kararsızım	32	20,5
	Katılıyorum	91	58,3
Fiziksel Muayene Dersi laboratuvar uygulama saati yeterliydi	Hiç katılmıyorum	34	21,8
	Katılmıyorum	44	28,2
	Kararsızım	54	34,6
	Katılıyorum	24	15,4
Fiziksel Muayene Dersi uygulamasının gerçekleştirildiği ortam uygundu	Hiç katılmıyorum	4	2,6
	Katılmıyorum	13	8,3
	Kararsızım	40	25,6
	Katılıyorum	99	63,5
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması için kullanılan simülatör etkili ve yeterliydi	Hiç katılmıyorum	7	4,5
	Katılmıyorum	25	16,0
	Kararsızım	41	26,3
	Katılıyorum	83	53,2
Laboratuvar uygulamaları sırasında öğretim elemanının öğrenciye verdiği destek yeterliydi	Hiç katılmıyorum	4	2,6
	Katılmıyorum	9	5,8
	Kararsızım	32	20,5
	Katılıyorum	111	71,2
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında kullanılan simülatörde akciğer seslerini rahatça duyabildim	Hiç katılmıyorum	3	1,9
	Katılmıyorum	16	10,3
	Kararsızım	36	23,1
	Katılıyorum	101	64,7
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında kullanılan simülatörde akciğer seslerini rahatça ayırt edebildim	Hiç katılmıyorum	5	3,2
	Katılmıyorum	17	10,9
	Kararsızım	62	39,7
	Katılıyorum	72	46,2
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde bağırsak seslerini rahatça duyabildim	Hiç katılmıyorum	9	5,8
	Katılmıyorum	12	7,7
	Kararsızım	55	35,3
	Katılıyorum	80	51,3
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde kalp seslerini rahatça duyabildim	Hiç katılmıyorum	3	1,9
	Katılmıyorum	12	7,7
	Kararsızım	29	18,6
	Katılıyorum	112	71,8
Simülatörde uygulama yapmak bana gerçekmiş gibi hissettirdi	Hiç katılmıyorum	8	5,1
	Katılmıyorum	22	14,1
	Kararsızım	45	28,8
	Katılıyorum	81	51,9
Uygulamanın son aşamasında öğretim elemanının simülatörden karışık sunduğu akciğer seslerinden raller, whezing, ronküsü ayırt ederek doğru cevap verebildim	Hiç katılmıyorum	4	2,6
	Katılmıyorum	29	18,6
	Kararsızım	25	16,0
	Katılıyorum	98	62,8
Toplam		156	100

Tablo 3. Öğrencilerin fiziksel muayene dersi ile ilgili görüşlerine yönelik maddelerinin ortalama, standart sapma ve ortanca puan değerleri

Sorular	\bar{x}^*	S.S.**	Ortanca \pm (min-max)***
Fiziksel Muayene Dersi teorik ders saati yeterliydi	3,30	0,96	4,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi laboratuvar uygulama saati yeterliydi	2,44	1,00	2,50 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulamasının gerçekleştirdiği ortam uygundu	3,50	0,76	4,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması için kullanılan simülatör etkili ve yeterliydi	3,28	0,89	4,00 \pm (1-4)
Laboratuvar uygulamaları sırasında öğretim elemanının öğrenciye verdiği destek yeterliydi	3,60	0,72	4,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında kullanılan simülatörde akciğer seslerini rahatça duyabildim	3,51	0,76	4,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında kullanılan simülatörde akciğer seslerini rahatça ayırt edebildim	3,29	0,79	3,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde bağırsak seslerini rahatça duyabildim	3,32	0,85	4,00 \pm (1-4)
Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde kalp seslerini rahatça duyabildim	3,60	0,72	4,00 \pm (1-4)
Simülatörde uygulama yapmak bana gerçekmiş gibi hissettirdi	3,28	0,89	4,00 \pm (1-4)
Uygulamanın son aşamasında öğretim elemanının simülatörden karışık sunduğu akciğer seslerinden raller, wheezing, ronküsü ayırt ederek doğru cevap verebildim	3,39	0,88	4,00 \pm (1-4)

* \bar{x} :Aritmetik Ortalama, **S.S.: Standart Sapma, ***Min:Minimum, Max:Maximum

Tartışma

Çalışma sonuçları incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin %58,3'ünün Fiziksel Muayene Dersi'nin teorik ders saatini yeterli olarak değerlendirdikleri, %34,6'sının ise laboratuvar uygulama saatinin yeterliliği konusunda kararsız olduklarını belirttikleri görülmüştür. Aynı zamanda öğrenci görüşlerine yönelik madde puan ortalamaları incelendiğinde ise "Fiziksel Muayene Dersi laboratuvar uygulama saati yeterliydi" maddesinin en düşük madde puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarını destekleyen veya desteklemeyen farklı araştırma sonuçlarına rastlanmamış olup, Birks ve ark. (2014)'nın 53 akademisyen ile yaptığı çalışmasında, öğretilen 121 fiziksel muayene becerisinin %57'sinin öğrencilere uygulama yaptırılarak, %24'ünün ise uygulama yaptırılmaksızın öğretildiği belirtilmektedir (13). Bu doğrultuda, çalışma sonuçları ışığında öğrencilerin daha fazla sayıda fiziksel muayene becerisini uygulama yaparak öğrenmek istedikleri belirtilebilir.

Literatür incelendiğinde fiziksel muayene gerçekleştirebilme yeterliliğinin profesyonel hemşirelik uygulamalarında önemli bir bileşen olduğu kabul edilmekle birlikte, öğrencilere ders kapsamında öğretilen içeriğin ihtiyaç duyulandan daha fazla olup olmadığı tartışılmaktadır (14,15). Giddens (2007)'in hemşireler ile yaptığı çalışmasında öğretilen fiziksel muayene becerilerinin sadece %30'unun rutin olarak uygulandığı, geri kalan becerilerin ise çok nadir veya hiç uygulanmadığı otaya koyulmuştur (16). Benzer şekilde Birks ve ark. (2014)'nin çalışmasında fiziksel

muayene becerilerinin sadece %34'ünün rutin olarak uygulandığı, %35,5'inin hiç uygulanmadığı ve %31'inin ise nadir olarak uygulandığı görülmüştür (13). Yine Giddens (2006)'in çalışmasında hemşireler tarafından en sıklıkla kullanılan fiziksel muayene becerilerinin kardiyovasküler ve solunum sistemi değerlendirmesi için kullanılan beceriler olduğu belirtilmiştir (17). Amerika, Avustralya, Kanada (18) ve Yeni Zelanda gibi (19) birçok ülkede hemşirelik eğitiminin temel bir bileşeni olan fiziksel muayene derslerinde, eğitimcilerin hemşirelik için gerekliliği yüksek fiziksel muayene yeterliliklerine odaklanmaları gerektiği belirtilmektedir (20).

Çalışmada öğrencilerin %63,5'inin uygulama ortamının uygun ve %53,2'sinin uygulamada kullanılan yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülatörün etkili ve yeterli olduğunu belirttikleri bulunmuştur. Benzer şekilde Bremner ve ark. (2006)'nın hemşirelik öğrencileri ile yaptığı çalışmasında öğrenciler bilgisayarlı simülatör kullanılarak verilen fiziksel muayene beceri eğitiminin kendilerine olan güveni arttırdığını (%62), mükemmel bir deneyim sağladığını (%91) ve hemşirelik eğitiminde zorunlu olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini (%68) ifade etmişlerdir (21). Çalışma sonucundan farklı olarak yapılan diğer çalışmalarda hemşirelik öğrencileri, kliniğe çıkmadan önce gerçekleştirdikleri uygulamaların ve laboratuvar ortamlarının yeterli ve uygun olmadığını ve bu nedenle öğrendikleri teorik bilgileri klinik alanda yeteri düzeyde uygulayamadıklarını ve yetersizlik hissi yaşadıklarını ifade etmişlerdir (22,23). Terzioğlu ve ark. (2012)'nin çalışmasında ise hemşirelik öğrencileri

Tablo 4. Öğrencilerin simülâtör kullanımı ile ilgili görüşleri (N=156)

Sorular	n	%
Herhangi bir fikri yok	6	3,8
Gerçeğe yakın, uygun olması	33	21,2
Uygulamanın konunun anlaşılabilirliğini artırması	31	19,9
Klinikte karşılaşılabilecek durumlara yabancılığı azaltması	9	5,8
Kliniğe çıkmadan uygulama yapabilme avantajı	6	3,8
Uygulama becerisine katkı sağlaması	16	10,3
Simülâtör kullanımının olumlu yönleri		
Sesleri ayırt edebilmeyi sağlaması	16	10,3
Gerçek hastadan duyulabilecek sesleri duyuyor gibi hissettirmesi	20	12,8
Klinikte karşılaşılabilecek durumlara yabancılığı azaltması + Uygulama becerisine katkı sağlaması + konunun anlaşılabilirliğini artırması	1	0,6
Deneyim kazandırarak kendine güveni artırması	14	9,0
Etkili bir öğretim yöntemi, eksikleri tamamlayabilme imkanı	1	0,6
Olumlu bir yönü yok	1	0,6
Stajda bu uygulamaları yaparken daha rahat olmayı sağlaması	2	1,3
Herhangi bir fikri yok	8	5,1
Sesler tam olarak ayırt edilmiyor	17	10,9
Öğrenci sayısı fazla, laboratuvar fiziki olarak küçük	15	9,6
Olumsuz bir yönü yok	55	35,3
Gerçek insan tepkisi olmadığı için gerçek uygulama kadar etkili değil	12	7,7
Tek simülâtör var	14	9,0
Laboratuvar saati az	9	5,8
Simülâtör kullanımının olumsuz yönleri		
Simülâtörde sesler net ve yüksek, gerçek hastada bu kadar rahat duyacağımı sanmıyorum	2	1,3
Bağırsak sesleri ayırt edilemiyor	1	0,6
Akciğer sesleri net duyulmuyor	2	1,3
Simülâtör çok ısınıyor, sesler bozuk gelebiliyor	8	5,1
Sesler duyulmuyor	9	5,8
Kalp seslerini duymadım	1	0,6
Teknik arızalar olabiliyor	1	0,6
Biraz tedirginlik yaratıyor	2	1,3
Herhangi bir fikri yok	10	6,4
Uygulama saatinin artırılması	67	42,9
Simülâtör sayısının artırılması	15	9,6
Uygulama saati ve simülâtör sayısının artırılması	23	14,7
Yeterince etkin olduğunu düşünüyorum	4	2,6
Önerim yok	12	7,7
Daha iyi simülâtörler gerekli	4	2,6
Uygulamada ortamın sessizleştirilmesi, kişi sayısının azaltılması	6	3,8
Simülâtörden gelen seslerin daha yüksek olması	4	2,6
Vaka sunumu ve tartışması yapılabilir	1	0,6
Her uygulama, teorik dersinin arkasından yapılmalı	3	1,9
Laboratuvar hemşirelik öğrencilerine sürekli açık olmalı	1	0,6
Normal sesleri birbirimizde dinlemek etkin olurdu	5	3,2
Devam zorunluluğu olmamalı	1	0,6
Toplam	156	100

Tablo 5. Öğrencilerin tanımlayıcı özellikleri ile fiziksel muayene dersi ile ilgili görüşlerinin toplam puanlarının karşılaştırılması

Sorular		Ortanca ± (min-max)*	Test Değeri
Cinsiyet	Kadın	38 ± (21-44)	p=0,366 U=2385,500
	Erkek	38 ± (19-44)	
Yaş Grupları	18-20	38 ± (19-44)	p=0,839 U=2378,500
	21-27	38 ± (22-44)	
Eğitim Alma Durumu	Evet	37 ± (24-44)	p=0,924 U=649,000
	Hayır	38 ± (19-44)	

*Min: Minimum, Max: Maximum

simülasyon uygulamalarını yararlı olarak değerlendirmiş ancak kendilerini daha yeterli hissedebilmek için kullanılan maketlerin gerçeklik düzeylerinin yüksek olması gerektiğini önermişlerdir (24). Bu doğrultuda yüksek gerçeklik düzeyine sahip simülatörlerin öğrencileri klinik alanda karşılaşılabilecekleri durumlara hazırlama, öğrencilerin yeterliliklerini ve öz güvenlerini arttırma konusunda etkili olduğu düşünülmektedir.

Uygulamada kullanılan simülatör üzerinde sesleri duyma ve ayırt edebilme durumları incelendiğinde, öğrencilerin %64,7'sinin akciğer seslerini, %51,3'ünün bağırsak seslerini ve %71,8'inin kalp seslerini rahatça duyabildiğini belirttikleri görülmüştür. Aynı zamanda madde puan ortalamaları değerlendirildiğinde "Fiziksel Muayene Dersi uygulaması kapsamında simülatörde kalp seslerini rahatça duyabildim" maddesinin en yüksek madde puan ortalamalarından birine sahip olduğu görülmektedir. Çalışmamıza benzer başka çalışmalara ulaşılammış olup, öğrencilerin en kolay kalp seslerini en zor ise bağırsak seslerini tanımlayabilmeleri dikkat çekmektedir.

Çalışmada ayrıca öğrencilerin %62,8'inin uygulama sırasında karışık olarak sunulan akciğer seslerini doğru ayırt edebildiğini belirttikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucuna benzer şekilde Tawalbeh (2017)' in yaptığı çalışmada kalp ve akciğerlere yönelik fiziksel muayene becerilerini simülasyon yöntemi kullanarak gerçekleştiren hemşirelik öğrencilerinin yeterlilik düzeyleri geleneksel öğrenme yöntemi kullanan öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (25). Aynı zamanda Multak ve ark. (2015)' nin çalışmasında kardiyopulmoner sistem fiziksel muayene ve tanılama becerilerinin öğreniminde simülasyon yöntemi kullanan tıp öğrencilerinin temel kardiyak oskültasyon bulgularını tanımlama ve doğru tanı koyabilme yeterliliklerinde anlamlı düzeyde artış saptandığı ifade edilmiştir (7). Yine Perlino ve ark. (2012)'nin tıp öğrencileri ile yaptıkları

çalışmasında simülasyon temelli kardiyak oskültasyonun öğrencilerin kardiyak tanı koyabilme düzeylerini %11,0'den %72,0'e çıkardığı belirtilmiştir (11). Çalışma sonucundan farklı olarak Chen ve ark. (2015)'nin çalışmasında hemşirelik öğrencilerinin kardiyak ve solunum seslerine yönelik oskültasyon becerilerinin gelişiminde yüksek gerçeklik ya da düşük gerçeklik düzeyine sahip simülasyonun öğrenci performansında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı ortaya konulmuştur (26). Simülasyon uygulamalarından farklı sonuçların alınabilmesinin, simülasyon uygulamalarının sunduğu gerçeklik düzeylerinin ve uygulama sürecindeki farklılıklardan (öğrencilerin uygulama becerilerinin öğretim elemanı tarafından gözlemi, video kayıt sistemlerinin kullanımı gibi) kaynaklanabileceği düşünülmektedir (27,28).

Çalışmada simülasyon yönteminin kullanımına yönelik belirtilen olumlu görüşler değerlendirildiğinde, öğrencilerin çoğunluğu simülasyon uygulamasının gerçeğe yakın ve uygun olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Reilly ve Spratt (2007)'in hemşirelik öğrencilerinin yüksek geçerlikli simülasyona dayalı öğrenmeye yönelik görüşlerini incelediği çalışmasında da öğrenciler simülasyon uygulamalarının yaptığı gerçeklik hissine vurgu yapmıştır (29). Yine Sundler, Pettersson ve Berglund (2015)'un hemşirelik öğrencileri ile görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirdiği çalışmasında yüksek gerçeklikli simülasyonun gerçekleştirilen deneyimi gerçekçi hale getirdiği belirtilmiştir (30). Smith ve Roehrs (2009)'in çalışmasında ise simülasyon uygulamalarının gerçeklik düzeyi ile uygulamalara katılan hemşirelik öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve özgüvenleri arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (31). Literatür incelendiğinde gerçekleştirilen birçok çalışma sonucu benzer şekilde çalışma sonuçlarını desteklemektedir (11,32-34). Öğrencilerin simülasyon uygulamasına yönelik çoğunlukla gerçeklik düzeyine vurgu yapmasının, gerçekleştirilen uygulamaların gerçeklik düzeyinin öğrencilerin klinik ortama hazır olma durumlarını etkilemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Simülasyon uygulamalarında kullanılan simülatörlerin gerçeklik düzeyi ve uygulama ortamının gerçek klinik ortama benzerliği arttıkça öğrencilerin kendilerine olan güvenleri, klinik karar verme becerileri ve psikomotor beceri yeterlilikleri de artmaktadır (35).

Öğrencilerin uygulamada simülasyon yönteminin kullanımına yönelik belirttikleri olumsuz görüşler incelendiğinde öğrencilerin %35,3'ü herhangi bir olumsuz görüş belirtmemiştir. Benzer şekilde literatürdeki çalışmalar incelendiğinde çoğunlukla yüksek gerçeklik düzeyi bulunan simülatörlerin etkinliği vurgulanırken (7,11,26,36), Terzioğlu ve ark. (2012)'nin hemşirelik öğrencilerinin simülasyon yöntemine ilişkin görüşlerini incelediği çalışmasında öğrenciler maket

ve mankenlerde oluşabilecek teknik sorunlara yönelik görüşlerde bulunmuşlardır (24). Nuzhat ve ark. (2014)'ın çalışmasında ise öğrencilerin simülasyon uygulamalarına yönelik algıladıkları sorunlar arasında uygulamalara dahil olan ekip ve uygulama sürelerine yönelik belirtilen sorunlar, belirtilen diğer sorunlara göre daha yüksektir (37).

Çalışmada öğrencilerin uygulamalarda simülatör kullanımına yönelik yaptıkları öneriler incelendiğinde, öğrencilerin %42,9'u uygulama saatlerinin arttırılmasını önermiştir. Çalışma sonucuna benzer şekilde Nuzhat ve ark. (2014)'nın çalışmasında öğretim elemanları %71,4 düzeyinde simülasyon uygulamalarının başarıyla gerçekleştirilebilmesi için daha fazla süre gerekliliğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda hem öğretim elemanları hem de çalışmaya katılan öğrenciler simülasyonun değerlendirme aracı olarak da kullanılması konusunda görüş belirtmişlerdir (37). Ayrıca Najjar ve ark. (2015)'nin çalışmasında öğrenciler simülasyon uygulamalarının beceri laboratuvarlarında gerçekleştirilen tekrarlı uygulamalardan daha öğretici olduğunu ve simülasyon uygulamalarının kendilerini daha yeterli hissetmelerine yardımcı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca aynı çalışmada öğrenciler her bir simülasyon uygulaması sonrası klinik deneyimlerini bütünleştirmeyi daha kolay bulmuştur. Çünkü öğrenciler daha fazla simülasyon uygulaması gerçekleştirdikçe eylemler arasındaki bağlantıları daha kolay ve hızlı şekilde kurabilmektedir (38). Bu konuda Cordeau (2012)'nin hemşirelik öğrencilerinin simülasyon deneyimlerine yönelik görüşlerini incelediği çalışmasında öğrenciler her simülasyon deneyiminin kendilerini klinik uygulamalara hazırlamada etkili olduğunu hissettiklerini belirtmişlerdir (39).

Kaynaklar

1. Eyikara E, Göçmen-Baykara Z. Effect of simulation on the ability of first year nursing students to learn vital signs. *Nurse Educ Today* 2018;60:101-6. [CrossRef]
2. Abe BY, Kawahara C, Yamashina A, Tsuboi R. Repeated scenario simulation to improve competency in critical care: A new approach for nursing education. *Am J Crit Care* 2013;22:33-40. [CrossRef]
3. Debourgh GA, Prion S. Using simulation to teach prelicensure nursing students to minimize patient risk and harm. *Clinical Simulation Nursing* 2011;7:47-56. [CrossRef]
4. Robinson BK, Dearmon V. Evidence-based nursing education: Effective use of instructional design and simulated learning environments to enhance knowledge transfer in undergraduate nursing students. *J Prof Nurs*. 2013;29:203-9. [CrossRef]
5. Edeer AD, Sarıkaya A. Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı ve Simülasyon Tipleri. *Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi* 2015;12:121-5.
6. Bland AJ, Topping A, Wood B. A concept analysis of simulation as a learning strategy in the education of undergraduate nursing students. *Nurse Educ Today* 2011;31:664-70. [CrossRef]
7. Multak N, Newell K, Spear S, Scalese RJ, Issenberg B. A Multi-Institutional Study Using Simulation to Teach Cardiopulmonary Physical Examination and Diagnosis Skills to Physician Assistant Students. *J Physician Assist Educ*. 2015;26:70-6. [CrossRef]
8. Berragan L. Simulation: an effective pedagogical approach for nursing?. *Nurse Educ Today* 2011;31:660-3. [CrossRef]
9. MacLean S, Kelly M, Geddes F, Dell P. Use of simulated patients to develop communication skills in nursing education: An integrative review. *Nurse Educ Today* 2017;48:90-8. [CrossRef]
10. Rosen KR. The history of medical simulation. *J Crit Care* 2008;23:157-66. [CrossRef]
11. Perlina S, Musca F. Simulation-guided cardiac auscultation improves medical students' clinical skills: The Pavia pilot experience. *Intern Emerg Med* 2012;9:165-72. [CrossRef]
12. Endacott R, Jevon P, Cooper S. *Clinical nursing skills- Core and advanced*. Oxford: Oxford University Press 2009.
13. Birks M, James A, Chung C, Cant R, Davis J. The teaching of physical assessment skills in pre-registration nursing programmes in Australia: Issues for nursing education. *Collegian* 2014;21:245-53. [CrossRef]

Sonuç

Çalışma sonuçlarına göre hemşirelik öğrencilerinin yarısından fazlası fiziksel muayene dersinin teorik ders saatini, uygulama sırasında öğretim elemanı tarafından verilen desteği yeterli bulmuş, simülatörde uygulama yapmanın gerçekmiş gibi hissettirdiğini belirtmiş ve uygulamanın gerçekleştirildiği ortamı ve simülatörü etkili ve yeterli olarak değerlendirmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin çoğunluğunun simülatörde akciğer, kalp ve bağırsak seslerini rahatça duyabildikleri ve anormal akciğer seslerini doğru ayırt edebildikleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin çoğunluğunun simülatör kullanımına yönelik olarak simülatörün gerçeğe yakın ve uygun olduğunu belirttikleri, olumsuz görüş belirtmedikleri ve uygulama saatini yeterli bulmayarak uygulama saatlerinin arttırılmasını önerdikleri tespit edilmiştir.

Literatür ve çalışma sonuçları ışığında hemşirelik eğitiminde fiziksel muayene becerileri açısından yeterli öğrenciler yetiştirmek amacıyla ders uygulamalarına gerçeklik düzeyi yüksek simülatörlerin dahil edilmesi ve öğrencilerin bilgi ve beceri entegrasyonunu geliştirecek farklı simülasyon senaryolarının dahil edilmesi önerilmektedir. Aynı zamanda uygulama saatlerinin arttırılmasının fiziksel muayene becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra hemşirelik eğitiminde verilen fiziksel muayene dersleri ile ilgili yapılacak ileri ki çalışmalar; literatüre öğrencilerin ders ve uygulamalar konusundaki görüşlerini, uygulamaların ve uygulama materyallerinin etkinliğini anlamada yardımcı olacak bulgular kazandıracaktır.

14. Fennessey A, Wittmann- Price RA. Physical assessment: a continuing need for 447 clarification. *Nurs Forum*, 2011;46:45-50. [\[CrossRef\]](#)
15. Giddens JF, Eddy L. A survey of physical examination skills taught in undergraduate nursing programs: are we teaching too much? *J Nurs Educ*. 2009;48:24-9. [\[CrossRef\]](#)
16. Giddens JF. A survey of physical assessment techniques performed by RNs: lessons for nursing education. *J Nurs Educ* 2007;46:83-7. [\[CrossRef\]](#)
17. Giddens J. Comparing the frequency of physical examination techniques performed by associate and baccalaureate degree prepared nurses in clinical practice: Does education make a difference?. *J Nurs Educ*, 2006;45:136-9. [\[CrossRef\]](#)
18. Lesa R, Dixon A. Physical assessment: implications for nurse educators and nursing practice. *Int Council Nurs* 2007;54:166-72. [\[CrossRef\]](#)
19. Zambas SI. Purpose of the systematic physical assessment in everyday practice: critique 452 of a "sacred cow". *J Nurs Educ* 2010;49:305-10. 453. [\[CrossRef\]](#)
20. Anderson B, Nix E, Norman B, McPike HD. An evidence based approach to undergraduate physical assessment practicum course development. *Nurs Educ Pract* 2014;14:242-6. [\[CrossRef\]](#)
21. Bremner MN, Aduddell K, Bennett DN, VanGeest JB. The use of human patient Simulator. *Nurs Educ* 2006;31:170-4. [\[CrossRef\]](#)
22. Kapucu S, Bulut H. Turkish nursing students' views of their clinical learning environment: A focus group study. *Pak J Med Sci* 2011;27:1149-53.
23. Schoening AM, Sittner AJ, Todd MJ. Simulated clinical experience: nursing students' perceptions and educators' role. *Nurs Educ* 2006;31:253-8. [\[CrossRef\]](#)
24. Terzioğlu F, Kapucu S, Özdemir L, Boztepe H, Duygulu S, Tuna Z, ve ark. Simülasyon yöntemine ilişkin hemşirelik öğrencilerinin görüşleri. *Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Derg* 2012;19:16-23.
25. Tawalbeh LI. Effect of simulation on the confidence of university nursing students in applying cardiopulmonary assessment skills: A randomized controlled trial. *J Nurs Res* 2017;25:289-95. [\[CrossRef\]](#)
26. Chen R, Grierson LE, Norman GR. Evaluating the impact of high-and low-fidelity instruction in the development of auscultation skills. *Med Educ* 2015;49:276-85. [\[CrossRef\]](#)
27. Al-Ghareeb AZ, Cooper SJ, McKenna LG. Anxiety and clinical performance in simulated setting in undergraduate health professionals education: an integrative review. *Clinical Simulation in Nursing* 2017;13:478-91. [\[CrossRef\]](#)
28. Hengameh H, Afsaneh R, Morteza K, Hosein M, Marjan SM, Ebadi A. The effect of applying direct observation of procedural skills (dops) on nursing students' clinical skills: a randomized clinical trial. *Global Journal of Health Science* 2015;7:17-21. [\[CrossRef\]](#)
29. Reilly A, Spratt C. The perceptions of undergraduate student nurse of high-fidelity simulation-based learning: a case report from the University of Tasmania. *Nurs Educ Today* 2007; 27:542. [\[CrossRef\]](#)
30. Sundler AJ, Pettersson A, Berglund M. Undergraduate nursing students' experiences when examining nursing skills in clinical simulation laboratories with high-fidelity patient simulators: A phenomenological research study. *Nurs Educ Today* 2015;35:1257-61. [\[CrossRef\]](#)
31. Smith SJ, Roehrs CJ. High-fidelity simulation: factors correlated with nursing student satisfaction and self-confidence. *Nurs Educ Perspect* 2009;30:74-8.
32. Garrett B, MacPhee M, Jackson C. High-fidelity patient simulation: considerations for effective learning. *Nurs Educ Perspect* 2010;31:309-13.
33. Hoadley TA. Learning advanced cardiac life support: a comparison study of the effects of low-and high-fidelity simulation. *Nurs Educ Perspect* 2009;30:91-5.
34. Cantrell MA, Meakim C, Cash K. Development and evaluation of three pediatric-based clinical simulation. *Clinical Simulation in Nursing* 2008;4:e21-e28. [\[CrossRef\]](#)
35. Göriş S, Bilgi N, Bayındır SK. Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı. *Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi* 2014;1:25-9.
36. Bingham AL, Sen S, Finn LA, Cawley MJ. Retention of advanced cardiac life support knowledge and skills following high-fidelity mannequin simulation training. *Am J Pharm Educ* 2015;79:12. [\[CrossRef\]](#)
37. Nuzhat A, Salem RO, Al-Sehri FN, Al-Hamdan N. Role and challenges of simulation in undergraduate curriculum. *Medical Teacher* 2014;36:S69-S73. [\[CrossRef\]](#)
38. Najjar, R., Lyman, B., Miehle, N. Nursing students' experiences with high-fidelity simulation. *International Journal of Nursing Education Scholarship* 2015;12:1-9. [\[CrossRef\]](#)
39. Cordeau, M.A. Linking the transition: A substantive theory of high-stakes clinical simulation. *Advances in Nursing Science* 2012;35:E90-E102. [\[CrossRef\]](#)