

Hidroksisinasamik Asit Türevlerinin Canlı-Dışı *Helicobacter Pylori* Karşıtı Etkileri ile Üreaz Enzimini Engelleme Etkinliklerinin Araştırılması

Sinem Oktem-Okullu¹, Nesteren Mansur², Erkan Mozioglu³, Meltem Kolgazi⁴

¹Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye

²Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal Biyoteknoloji Programı, İstanbul, Türkiye

³Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye

⁴Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Fizyoloji, İstanbul, Türkiye

Sinem Oktem-Okullu, Dr. Öğr. Üyesi
Nesteren Mansur, MSc
Erkan Mozioglu, Dr. Öğr. Üyesi
Meltem Kolgazi, Dr. Öğr. Üyesi

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Sinem Oktem-Okullu
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 554 587 48 28
E-Posta: sinem.oktem@acibadem.edu.tr

Gönderilme Tarihi : 08 Nisan 2019
Revizyon Tarihi : 01 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 23 Ağustos 2019

ÖZET

Helicobacter pylori (*H. pylori*), insanlarda, gastrit, peptik ülser, gastrik kanser ve mukoza ilintili lenfoid doku lenfoması gibi ciddi mide hastalıklarına yol açan önemli bir hastalık etkenidir. *H. pylori*, ürettiği üreaz enzimleri sayesinde üreyi, karbondioksit ve amonyağa parçalayarak mide çevresinin asidik koşullarını normal pH'ya getirip hayatta kalabildiği için bu bakterilerle vücudun savaşımı kolay değildir. *H. pylori* enfeksiyonları için antibiyotikler mevcut olsa da antibiyotik direnci gelişimi nedeniyle bu tedaviler sonuçsuz kalabilmekte ve yeni antibiyotiklere gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Hidroksisinasamik asit türevleri basit fenolik asitler olup meyvelerde, meyve çekirdeklerinde ve sebzelerde bulunmaktadır. Ferulik asit, kafeik asit, p-kumarik asit, sinapik asit, sözü edilen bu fenolik asit grubuna ait olup antioksidan, anti-inflamatuvar, antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve bu nedenle bazı bakterie enfeksiyonlarının tedavisinde, ilaçlara seçenek olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmamızda, bu üç fenolik asidin *H. pylori* üzerindeki antimikrobiyal etkinliği ve üreaz enzimini engelleme etkisi araştırıldı.

Hidroksisinasamik asit türevlerinin anti-*H. pylori* etkisi *H. pylori* G27 standart suşu üzerinde test edildi. Minimum inhibisyon konsantrasyonu (MİK), değerleri 512 ila 0,5 µg/mL arasında değiştiği seri tüp seyreltme yöntemiyle, minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) değerleri ise MİK içinde kullanılan aynı konsantrasyonlarda canlı ve ölü bakterilerin nispi oranının hesaplanması ile belirlendi. MİK için CLSI M07-A9, MBK için CLSI M26-A protokolleri kullanıldı. Üreaz inhibisyon aktivitesi Helicheck, üreaz aktivitesine özgü indikatörlü besiyerinde ölçülmüştür.

H. pylori'ye karşı test edilen tüm bileşikler için MİK 64 µg/mL ve MBK 128 µg/mL idi. Test edilen bileşiklerin *H. pylori* tarafından salgılanan üreaz enzimi üzerinde hiçbir inhibisyonu saptanmadı. Nükleotid salma deneyi sonuçlarına göre, hidroksisinasamik asit türevlerinin bakterie zarında hasara sebep olması ile zarda oluşan deliklerden dışarı salınma eğiliminde olması beklenen herhangi bir nükleotid miktarı ölçülmemiştir.

Gerçekleştirilen bu çalışma, literatür taramalarımız doğrultusunda, hidroksisinasamik asit türevlerinin anti-*H. pylori* aktivitesini gösteren ilk çalışmadır. Bu bileşiklerin anti-*H. pylori* üzerindeki etki mekanizmasını anlamak için daha ileri analizlere ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: *H. pylori*, Anti-*H. pylori* Etki, hidroksisinasamik asit türevleri, üreaz i nhibisyon, nükleotid salınım testleri

IN VITRO ANTI-HELICOBACTER PYLORI EFFECTS OF HYDROXYCINNAMIC ACID DERIVATIVES AND THEIR UREASE INHIBITION STUDIES ON *H. PYLORI* UREASE ENZYME

ABSTRACT

Helicobacter pylori (*H. pylori*) is a human pathogen that can persist in the stomach of infected people for their life spans. It causes chronic gastric inflammation leading to serious gastric diseases such as gastritis, peptic ulcers, gastric cancer and mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma. To colonize in the acidic environment of the stomach, *H. pylori* produces urease enzyme that catalyzes the hydrolysis of urea to yield into ammonia and carbon dioxide. This enzyme neutralizes the acidic environment of the gastric lumen, and gives the bacteria a short-term survival in this highly acidic environment. There are numerous antibiotic-based therapies for the treatment of *H. pylori* infection. However, antibiotic resistance has a significant impact on the failure of these treatments.

Hydroxycinnamic acid derivatives are simple phenolic acids, found mainly in cereals, fruits, seeds of fruits and vegetables. Ferulic acid, Caffeic acid, p-Coumaric acid, and Sinapic acid belong to this phenolic acid group. These derivatives act as antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial agents and have been used for the treatment of some bacterial infections as alternatives to drugs.

The objective of this study was to investigate the anti-*H. pylori* and urease enzyme inhibitory effects of Ferulic acid, Caffeic acid, p-Coumaric acid and Sinapic acid.

The effect of hydroxycinnamic acid derivatives was tested on *H. pylori* standard train G27. MIC was determined by serial tube dilution method in which the final concentration ranged between 512 to 0.5 µg/ml and MBC was determined by calculating the relative proportion of live and dead bacteria with the same concentration range used in MIC. For MIC, the CLSI M07-A9 and for MBC CLSI M26-A protocols were used. Urease inhibitory activity was detected by Helicheck, *H. pylori*-specific growth media shows urease activity by changing the color of the media. Nucleotide release was measured by spectrophotometry. The MIC was 64 µg/ml and MBC was 128 µg/ml for all compounds and they had no effect on urease enzyme. There was no detectable nucleotide release from the bacterial membrane because of the hydroxycinnamic acid derivatives damage.

As a result, to the best of our knowledge, it is the first report that shows anti-*H. pylori* activity of the hydroxycinnamic acid derivatives. Further analyses are needed to understand the action mechanism of these compounds on anti-*H. pylori* property.

Keywords: *H. pylori*, anti-*helicobacter pylori* effect, hydroxycinnamic acid derivatives, urease inhibition, nucleotide release assay

Helicobacter pylori (*H. pylori*) is asidik mide ortamında başarıyla yerleşebilen en önemli insan hastalık etkenlerinden biridir ve genellikle erken çocukluk evresinde öpüşme, tükürük, mikrop ile bulaş gıda ve suların tüketimi, ebeveynler ile aynı çatal-kaşık kullanımı, gastroskopi sırasında aletlerin yeterince steril edilmemesi gibi yolları ile kazanılmaktadır; tedavi edilmezse kişilerin yaşamları boyunca varlığını sürdürülebilmektedir (1). Bugün, dünya nüfusunun yarısından fazlasına bulaştığı tahmin edilmekle birlikte belirti göstermezken bulaştığı kişilerin %20'sinde, peptik ülser, kronik gastrit, mukoza ilintili lenfoid doku lenfoması (MALT) gibi ciddi mide-bağırsak hastalıklarının temel risk etkeni olarak tanımlanmaktadır (2). Aynı zamanda, idiyomatik trombositopenik purpura, demir eksikliği kansızlığı ve B12 vitamini eksikliği gibi sindirim hastalıkları ile de ilintilidir (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, *H. pylori* 1. sınıf karsinojen olarak tanımlanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde, *H. pylori* enfeksiyonlarının yaygınlığı gelişmiş ülkelere göre fazladır ve bu oran Türk yetişkin nüfusu için %70–80'dir. Türkiye'de, çocukların serolojik yaygınlığının %43,9–53,9 olduğu bildirilmektedir (3).

H. pylori enfeksiyonunun giderilmesi için, proton pompası engelleyicisiyle birlikte en az iki antibiyotiğin birlikte verilmesi gerekmekte ve bu tedavinin başarı oranı %80'lerde kalmaktadır (4). Ayrıca, ilaçların yan etkileri, zayıf uyum ve antibiyotiklere direnç gelişiminin gözlenmesi ek sorunlar getirmektedir. Tedavi için tedavisinde yeni antibiyotiklere gereksinim duyulan bakterilerin yer aldığı DSÖ'nün son yayımladığı listede, klaritromisin dirençli *H. pylori* yüksek öncelikli grup içerisine dâhil edildiği göz önüne alındığında *H. pylori* dahil tüm bu dirençli bakterilerin ilaca direnç gelişim sorunlarının üstesinden gelebilmek için, doğal ürünler başta olmak üzere yeni moleküllerin keşfedilmesi yönündeki çabalar büyük önem taşımaktadır (5).

Mide mukozasında *H. pylori*'nin yerleşmesi, bakterinin hareketi, üreaz enzim üretimi ve tutunmadaki başarısı ile ilgilidir (6). Üreaz enzimin yardımıyla, *H. pylori* yüksek asidik mide ortamında, kısa süreli bir yaşamda kalma şansı yakalar. Bunun yanı sıra, hareket yeteneği, mide mukozasının daha yönsüz pH'ındaki alanlara doğru bakterinin hızlı bir şekilde ilerleyebilmesine olanak verir. Üreazın bulunmaması halinde *H. pylori*, 4,0–8,0 aralığındaki pH'larda yaşayabilir.

Ancak, üreaz enzimi sayesinde, üre, karbondioksit (CO₂) ve amonyağa (NH₃) parçalanarak midenin asitliğini azaltarak bu bakterilerin, 2,5 gibi çok düşük pH'larda bile yaşayabilmesini olanaklı hale getirirler. Amonyak H⁺ iyonlarının alıcısı olarak iş görmesinin yanı sıra monokloramin gibi yerleştiği

konak hücreler üzerinde zehir etkisi gösteren amonyak türevlerinin oluşmasına öncülük eder. Tüm bu sebeplerden ötürü üreaz enzimi, *H. pylori* için tedavisinde kullanılacak yeni ilaçların önemli bir hedefi olarak düşünülmekte ve bu enzimi engelleyici yeni moleküllerin keşfedilmesi bu araştırmaların en önemli stratejisini oluşturmaktadır (7). Bu sebeple, *H. pylori* enfeksiyonlarının iyileştirilmesinde, dirim-bilimsel olarak etkin doğal kökenli ürünlerin üreaz engelleyicisi olma potansiyelleri araştırılmaktadır (8).


Hidroksisanimik asit türevleri, meyvelerde, sebzelerde, tahıllarda ve meyve çekirdeklerinde değişen miktarlarda bulunan polifenolik bileşenlerinin önemli bir grubunu temsil etmektedir (Tablo 1). Hidroksisanimik asit türevlerinden olan kafeik asit birçok meyvede baskın olarak bulunmaktadır; erik, elma, kayısı, yabanmersini ve domateste bulunana toplam hidroksisanimik asit türevlerinin %75'ini oluşturmaktadır. Bunu ile birlikte p-kumarik asit, turunçgillerin ve ananasın baskın hidroksisanimik asitidir. Hidroksisanimik asitler, bağlı formda geniş ölçüde bulunurlar ve nadiren serbest formda bulunurlar. Meyve ve sebzelerin işlenmesi (donma, sterilizasyon ve fermentasyon) bu tür ürünlerdeki serbest hidroksisanimik asitlerin oluşumuna katkıda bulunur. Klorojenik asit elma, kayısı, çilek, şeftali, armut, erik, avokado ve havuç gibi birçok

Tablo 1. Bazı meyve ve bitkilerin fenolik bileşik içeriği

Tür	Fenolik içerik (mg / 100 g)	Kaynaklar
Yaban Mersini (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	525	(9)
Böğürtlen (<i>Rubus fruticosus</i>)	361, 417–555	(10, 11)
Siyah Frenk Üzüümü (<i>Ribes nigrum</i>)	318,15, 498–1342	(12, 13)
Mavi Yemiş (<i>Vaccinium corymbosum</i>)	181,1–473, 261–585	(9, 14)
Çilek (<i>Fragaria ananassa</i>)	317,2–443,4, 102	(15, 16)
Ahududu (<i>Rubus idaeus</i>)	113,73–177,6, 192–359, 517, 330	(17–20)
Turna Yemişi (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	120–176,5, 315	(21, 22)
Kekik (<i>Origanum vulgare subsp. hirtum</i>)	1175,72	(23)
Nane (<i>Mentha spicata</i>)	1000,89	(23)
Adaçayı (<i>Salvia tomentosa</i>)	1144,93	(23)
Kantaron (<i>Hypericum perforatum</i>)	515,8	(23)

gıdada bulunur. Klorojenik asit, özellikle elmalar ve armutlarda enzimatik esmerleşme için anahtar substrattır. Armut kabuğunun kızarması sırasında içeriği %20 azalır.

Kafeik asit, ferulik asit, p-kumarik asit, sinapik asit ve rosmarinik asit, antioksidan, anti-inflamatuvar ve antimikrobiyal etkileri olduğu bilinen bu önemli fenolik asit grubunun üyelerindedir (Şekil 1). Bu bileşenlerin, doğal yaşamlarında, bitkilerin kokularının, lezzetlerinin ve renklerinin oluşumlarından sorumlu oldukları ve onları, mor-ötesi ışınlar karşısında virüslere, bakterilere, böceklerle ve hatta digger bitkilere karşı korumada rol aldıkları bilinmekle birlikte yangı, şişmanlık ile yağ metabolizması, vücut ağırlığı ile obezite, diyabet ile insülin direnci gibi bazı metabolik belirlenimler (semptomlar) üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir (24).



Şekil 1. Hidroksisinasamik asitler ve türevleri (25).

Hidroksisinasamik asit türevleri, mide ve bağırsak sisteminde kolaylıkla emildikleri ve Gram (+) ve Gram (-) bakteriler üzerinde karşıt etkinlikleri olduğu gösterilmiştir (26). Bununla birlikte, bu bileşenlerin, *H. pylori* üzerindeki karşıt etkinlikleri henüz gösterilmemiştir. Bu çalışmamızda, ferulik asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve sinapik asit gibi dört farklı hidroksisinasamik asit türevinin *H. pylori*'ye karşıt etkinliği ve üreaz enzim etkinliğinin engellenme potansiyeli araştırıldı; bizim bilgimize göre, bu araştırma, bilim yazınındaki (literatüründeki) ilk çalışmadır.

Gereç ve yöntemler

Hidroksisinasamik asit türevleri

Hidroksisinasamik asit türevleri olan ferulik asit (trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid), kafeik asit (3,4-dihydroxycinnamic acid), p-kumarik asit (trans-4-hydroxycinnamic acid) ve sinapik asit (trans-4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnamic acid) Sigma-Aldrich (Almanya) şirketinden satın alındı.

H. pylori kültürü

Bu çalışmada kullanılan *H. pylori* standart soyu G27 Zürih Üniversitesi, Moleküler Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Anne Mueller'in hediyesidir. *H. pylori* G27 BD Helicobacter Columbia Agar'da (Becton Dickinson, Germany), mikroaerofilik koşullarda, 37°C'de, 24 saat bekletilerek büyütüldü.

En düşük önleyici derişim (Minimum inhibitör konsantrasyonu = MİK)

Bakteriler, Helicobacter Columbia Agar'da, 37°C'de, mikroaerofilik koşullarda, 24 saat boyunca büyütüldü ve daha sonra 10 %FBS (GIBCO) ve 1x Vancomisin (Vancotek, Koçak İlaç, Türkiye) içeren Brucella Broth (Oxoid) besiyerine aktarıldı; burada da aynı koşullarda 24 saat bekletildi. Daha sonra, bakteriler 0,5 McFarland olacak şekilde (1,5x10⁸ cfu/mL) seyreltilti. Seyreltilmiş bakteriler, hidroksisinasamik asit türevleri dimetil sülfoksit (DMSO) içerisinde çözüldü ve 10 %FBS (GIBCO) ve 1x Vancomisin (Vancotek, Koçak İlaç, Türkiye) içeren Brucella Broth (Oxoid) besiyerinde iki katlık ardışık seyreltilmeleri yapıldı; 0,5 McFarland olarak hazırlanmış bakteriler, hidroksisinasamik asit türevlerini içeren tüplere ekildi; böylece, kimyasalların son derişimleri, 512 to 0,5 µg/mL oldu. DMSO ise (-) denetim olarak kullanıldı.

Tüpler 37 °C'de, 24 saat, mikroaerofilik koşullarda bekletildi ve bulanıklık izlendi. En düşük engelleyici derişim, hiç hidroksisinasamik asit içermeyen ve bakteri içeren (+) denetim tüpünde bulanıklık görüldüğünde belirlendi; hiç bakteri içermeyen tüpler, bulanıklık oluşturmaması beklenen ikinci bir (-) denetim olarak gözlemlendi.

Bakterileri öldürücü en düşük derişim (Minimum bakterisidal konsantrasyon=MBK)

En düşük engelleyici derişim çalışmasından sonra, bakteri büyümesi görülmeyen tüplerin her birinden 10 µl alınıp Helicobacter Columbia Agar'a ekildi ve petriler, mikroaerofilik koşullarda, 37°C'de gece boyu bekletildi; kimyasallardan, bakterileri tümüyle öldüren en düşük derişim belirlendi.

Üreaz engelleme deneyi

Ferulik asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve sinapik asidin *H. pylori*'nin ürettiği üreaz enzimleri üzerindeki doğrudan engelleyici etkisi olup olmadığı Helicheck (SALUBRIS, Türkiye) kullanılarak araştırıldı. Üreaz enzimi varlığında, Helicheck'te var olan pH ayırıcı sayesinde renk sarıdan mora dönmektedir; bu parçalanma ürünü olan amonyak oluşması ile ilgilidir (27). Bu temel ilke kullanılarak *H. pylori*, 10 %FBS (GIBCO) ve 1x vankomisin (Vancotek,

Koçak İlaç, Türkiye) içeren Brucella Broth (Oxoid) içerisinde 37, °C'de, 24 saat büyütüldü ve tüpler santrifüjlenerek üst sıvı uzaklaştırıldı. Bakteriler, üç kez PBS tamponu (pH 7,4) ile yıkanarak üst sıvıda olabilecek tüm enzimler uzaklaştırıldı. Bakteriler, PBS içerisinde, hidroksisanimik asit türevlerinin son derişimi 512µg/ml olacak şekilde, oda sıcaklığında, 20 dakika bekletildi ve bakteri asıltısı (süspanسیونu) üreaz enzim etkinliğinin denemesi için Helicheck olarak adlandırılan *H. pylori*'ye özgü, üreaz aktivitesinin ortamda gerçekleştiğinde renk değişikliği gösteren besiyerine aktarıldı. Nükleotid salınım deneyleri spektrofotometrik ölçümler yapılarak gerçekleştirildi.

Hidroksisanimik asitler ile hiçbir işleme uğramayan bakteriler de aynı şekilde (-) denetim olarak kullanıldı. Üreaz enzim etkinliğinin varlığı veya yokluğu, renk değişiminin var veya yok olması şeklinde olarak belirlendi.

Nükleotid salınım deneyi

Hidroksisanimik asit türevlerinin, bakteri zarlarının geçirgenliği üzerindeki etkilerinin anlaşılması için nükleotid salınım deneyi yapıldı. Bu deneyin esası, denenen kimyasalların, bakteri zarında bir hasara yol açıp açmadığının hücrelerden salınan nükleotidlerin spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile ilgilidir (28). Bu amaçla, *H. pylori*, 10 %FBS ve 1× vankomisin içeren Brucella Broth (Oxoid) içerisinde 37°C'de, 24 saat büyütüldü ve tüpler santrifüjlenerek üst sıvı uzaklaştırıldı. Bakteriler, üç kez PBS tamponu (pH 7,4) ile yıkanarak üst sıvıdaki tüm nükleotidler uzaklaştırıldı ve son olarak, PBS içerisinde, hidroksisanimik asit türevlerinin son derişimi 512µg/ml olacak şekilde, oda sıcaklığında, 20 dakika bekletildikten sonra 5000xg'de üç dakika santrifüjlendi. Üst sıvının 260 nm'de soğurum (A260) değeri ölçüldü. Kimyasallarla hiçbir işleme uğramayan bakteriler ve DMSO, (-) denetim olarak kullanıldı. Verilerin çözümlemesi, GraphPad Prism 6 yazılımı kullanılarak yapıldı.

Sonuçlar

Birçok bitki, sebze ve meyvelerde bulunan ve antioksidan özellikleri nedeni ile çeşitli hastalıklara ve yaşlanmaya karşı koruduğu bilinen hidroksisanimik asit türevleri vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korumanın yanında antimikrobiyal etkileri nedeni ile saflaştırılarak elde edilen özütleri de birçok enfeksiyon etkenine karşı kullanılmaktadır. Dünyada insanların ortalama %50'sinin midesinde kolonize olduğu tahmin edilen *H. pylori*'nin tedavisi için, diğer mikroorganizmalara karşı olan etkisi bir seçenek olarak ortaya çıkan hidroksisanimik asit türevlerinden bazılarının *H. pylori* üzerindeki etkisi ve etki mekanizmaları bu çalışma ile anlaşılmaya çalışılmıştır.

En düşük önleyici derişim

Denenen hidroksisanimik asit türevlerinin *H. pylori*'yi engelleyici en düşük derişimi 64 µg/mL olarak bulunmuştur (Tablo 2).

Bakterileri öldürücü en düşük derişim

Denenen hidroksisanimik asit türevlerinin *H. pylori*'yi öldürücü en düşük derişimi 128 µg/mL olarak bulunmuştur (Tablo 3).

Mevcut çalışma ile hidroksisanimik asit türevleri, önemli bir *H. pylori* karşıtı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir: Engelleyici en düşük derişimi 64 µg/mL ve bakterileri öldürücü en düşük derişimi 128 µg/mL. Bu sonuçlar, *H. pylori*'nin artmış ilaç direncine karşı, bu doğal ürünlerin birer seçenek olabileceğine dair umut vericidir ve gelecekte, canlı-İçi çalışmaları da kapsayacak şekilde yeni deneyler, *H. pylori* enfeksiyonlarının tedavisinde, bu doğal ürünlerin yeni ilaçlar olarak kullanılabilir olup olamayacağını göstermesi bakımından önemli olacaktır.

Tablo 2. En düşük engelleyici derişim (MİK) sonuçları


Kimyasallar	En düşük engelleyici derişim (µg/mL)
Sinapik asit	64
Kafeik asit	64
Ferulik asit	64
p-Kumarik asit	64

Tablo 3. Bakterileri öldürücü en düşük derişim (MBK) sonuçları

Kimyasallar	Bakterileri öldürücü en düşük derişim (µg / mL)
Sinapik asit	128
Kafeik asit	128
Ferulik asit	128
p-Kumarik asit	128

Üreaz engelleme deneyi

Kafeik asit, ferulik asit, p-kumarik asit ve sinapik asidin *H. pylori*'nin üreaz enziminin etkinliğini engelleyip engellemediği araştırıldı ve bu amaçla renk değişimine dayalı bir yöntemi esas alan Helicheck kullanıldı. Hidroksisanimik asit türevleri ile buluşturulmamış bakteriler ile kıyaslandığında, bu kimyasallara maruz bırakılmış *H. pylori* tüpleri arasında, herhangi bir renk farklılığı gözlenmemiştir: Tüm tüplerde, sarıdan mora dönüşüm eşit miktarda gerçekleşmiştir (Şekil 2). Bu sonuçlara göre, denenen derişimlerdeki hidroksisanimik asit türevlerinin, *H. pylori* bakterisinin üreaz enziminin etkinliği üzerinde bir etkiye sahip değildir.




Şekil 2. Üreaz etkinliğini engelleme deneyi.

Nükleotid salınım deneyi

Hidroksisınamik asit türevlerinin bakteri zarının geçirgenliğini değiştirip değiştirmediğini belirlemek için nükleotid salınım deneyi yapıldı.

260 nm'deki soğurum değerleri karşılaştırıldığı da hidroksisınamik asit türevlerine bağlı olarak zardan geçerek hücre dışına salınan saptanabilir düzeyde nükleotid bulunamadı (Şekil 3).



Şekil 3. Nükleotid salınım deneyi

Sonuç olarak, hidroksisınamik asit türevlerinden ferulic asit, kafeik asit, p-kumarik asit ve sinapik asidin *H. pylori* karşıtı etkilere sahip olduğu gösterildi. Bu kimyasalların, bakterinin hücre zarının geçirgenliğini değiştirdiğine dair nükleotid salınımı timeline dayanan deneyde, kimyasallara maruz bırakılmayan denetim grubuna kıyasla saptanabilir bir fark gözlenmemiştir. Ayrıca, uygulanan mevcut yöntem ile bakterinin enzimini etkilediğini gösteren bir bulgu elde edilmemiştir. Gelecekte yeni ek çalışmalar, bu kimyasalların, *H. pylori* üzerindeki karşıt etkinliğin işlergesini (mekanizmasını) anlamamıza yardım edebilecektir.

Tartışma

H. pylori enfeksiyonları, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını etkilemektedir ve tedavisi, ilaç direnci, ilaçların yan etkileri ve pahalılığı nedeniyle zordur. Günümüzde, tedavide, clarithromycin, amoxicillin, metronidazole, levofloxacin, tetracycline ve rifabutini içeren yalnızca altı farklı antibiyotik çeşitli bileşkeleri kullanılabilir. Bu bağlamda, hem farmakolojik tedavilerle kıyaslandığında düşük maliyetli oluşları hem de düşük toksisite ve daha az yan etkilere sahip oluşları dikkate alındığında, doğal ürünlerin keşfi, bu tedavilerde yeni seçenekler oluşturabilecektir.

Hidroksisınamik asitler, meyve, sebze ve yemeklik mantar gibi birçok bitkilerde bulunan fenolik bileşiklerdendir ve kafeik asit, ferulic asit, p-kumarik asit, sinapik asit, klorojenik asit, rosmarinik asit gibi türleri mükemmel farmosetik potansiyele sahiptir ve anti-inflamatuvar, antioksidan, antimikrobiyal, antikoagulan, antitumor, antiviral etkinlik göstermektedirler.

Bugüne kadar, hidroksisınamik asit türevlerinin, birçok bakteriye karşı etkinlikleri gösterilmiş olsa da bildiğimiz kadarıyla, *H. pylori* için böyle bir sonuç henüz yayımlanmıştır (29). Dünyadaki en yaygın enfeksiyonlardan birinin kaynağı olan *H. pylori* enfeksiyonunun enfeksiyöz bir hastalık olarak ele alınıp tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Antibiyotik tedavisinin yalnız başına kullanıldığı zaman yeterli eradikasyon sağlanmadığı yapılan kaynak çalışmaları ile de gösterilmiştir. Antibiyotik tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif tedavi yöntemleri tercih edilmektedir. Bu nedenler doğrultusunda birçoğu günlük hayatta tüketilen meyve ve bitkilerin içeriğinde yer alan hidroksisınamik asit türevlerinin, meyve ve bitkilerden özütlenerek saf halde yoğunlaştırılması ile *H. pylori* ye karşı antimikrobiyal etkinliğinin gösterilmesi oldukça önem taşımaktadır. Etki mekanizmalarının aydınlatılması ve etkinliklerinde geliştirilmesi için yapılacak olan ek çalışmalar sayesinde hidroksisınamik asit türevlerinin *H. pylori* enfeksiyonunun tedavisinde kullanılacak alternatif bir yöntem haline gelecektir.

Sunulan bu çalışma, hidrokissinamik asit türevlerinden kafeik asit, ferulic asit, p-kumarik asit ve sinapik asidin *H. pylori* karşıtı etkisi ile ilgili bilim yazınındaki ilk çalışmadır.

Teşekkür

Bu çalışma Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi'nin Bilimsel Araştırma Proje Fonu (ABAPKO Proje numarası: 2017/01/07) tarafından desteklenmiştir. Zürih Üniversitesi, Moleküler Kanser Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Dr. Anne Mueller'e hediye ettiği *H. pylori* için teşekkür ederiz.

Kaynaklar

- Sipponen P, Hyvärinen H. Role of *Helicobacter pylori* in the Pathogenesis of Gastritis, Peptic Ulcer and Gastric Cancer. *Scand J Gastroenterol* 1993;28:196:3–6. [CrossRef]
- Correa P. *Helicobacter pylori* and gastric carcinogenesis. *Am J Surg Pathol* 1995;19:37–43.
- Ceylan A, Kırımı E, Tuncer O, Türkdoğan K, Arıyucu S, Ceylan N. Prevalence of *Helicobacter pylori* in Children and Their Family Members in a District in Turkey. *J Health Popul Nutr* 2007;25:4:422–7. Erişim: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2754017/>
- Maurizio ZR, Rabitti S, Eusebi LH, Bazzoli F. Treatment of *Helicobacter pylori* infection: A clinical practice update. *Eur J Clin Invest* 2018;48:e12857. [CrossRef]
- Alba C, Blanco A, Alarcon T. Antibiotic resistance in *Helicobacter pylori*. *Curr Opin Infect Dis* 2017;30:5:489–97. [CrossRef]
- Testerman TL, McGee DJ, Mobley HLT. Adherence and Colonization, Chap. 4. In: Mobley HLT, Mendz GL, Hazell SL, editors. *Helicobacter pylori: Physiology and Genetics*. Washington (DC): ASM Press; 2001.
- Hassan S, Šudomová M. The Development of Urease Inhibitors: What Opportunities Exist for Better Treatment of *Helicobacter pylori* Infection in Children? *Children* 2017;4:1. [CrossRef]
- Prior RL, Cao G, Martin A, Sofic E, McEwen J, O'Brien C, et al. Antioxidant capacity as influenced by total phenolic and anthocyanin content, maturity, and variety of *Vaccinium* species. *J Agric Food Chem* 1998;46:2686–93. [CrossRef]
- Heinonen IM, Meyer AS, Frankel EN. Antioxidant activity of berry phenolics on human low-density lipoprotein and liposome oxidation. *J Agric Food Chem* 1998;46:4107–12. [CrossRef]
- Sellappan S, Akoh CC, Krewer G. Phenolic compounds and antioxidant capacity of Georgia-grown blueberries and blackberries. *J Agric Food Chem* 2002;50:2432–8. [CrossRef]
- Borowska J, Szajdek A. Antioxidant activity of berry fruits and beverages. *Pol J Natl Sci* 2003;14.
- Moyer RA, Hummer KE, Finn CE, Frei B, Wrolstad RE. Anthocyanins, phenolics, and antioxidant capacity in diverse small fruits: *Vaccinium*, *Rubus*, and *Ribes*. *J Agric Food Chem* 2002;50:519–25. [CrossRef]
- Benvenuti S, Pellati F, Melegari M, Bertelli D. Polyphenols, anthocyanins, ascorbic acid, and radical scavenging activity of *Rubus*, *Ribes*, and *Aronia*. *J Food Sci* 2004;69:FCT164–9. [CrossRef]
- Wang SY, Stretch AW. Antioxidant capacity in cranberry is influenced by cultivar and storage temperature. *J Agric Food Chem* 2001;49:969–74. [CrossRef]
- Zheng W, Wang SY. Oxygen radical absorbing capacity of phenolics in blueberries, cranberries, chokeberries, and lingonberries. *J Agric Food Chem* 2003;51:502–9. [CrossRef]
- De Ancos B, González EM, Cano MP. Ellagic acid, vitamin C, and total phenolic contents and radical scavenging capacity affected by freezing and frozen storage in raspberry fruit. *J Agric Food Chem* 2000;48:4565–70. [CrossRef]
- Anttonen MJ, Karjalainen RO. Environmental and genetic variation of phenolic compounds in red raspberry. *J Food Comp Anal* 2005;18:759–69. [CrossRef]
- Wada L, Ou B. Antioxidant activity and phenolic content of Oregon caneberrries. *J Agric Food Chem* 2002;50:3495–500. [CrossRef]
- Proteggente AR, Pannala AS, Paganga G, Buren LV, Wagner E, Wiseman S, et al. The antioxidant activity of regularly consumed fruit and vegetables reflects their phenolic and vitamin C composition. *Free Radic Res* 2002;36:217–33. [CrossRef]
- Skupień K, Oszmiański J. Influence of titanium treatment on antioxidants content and antioxidant activity of strawberries. *Acta Sci Pol Tech Aliment* 2007;6:83–94. Erişim: https://www.food.actapol.net/pub/8_4_2007.pdf
- Zheng Y, Wang SY, Wang CY, Zheng W. Changes in strawberry phenolics, anthocyanins, and antioxidant capacity in response to high oxygen treatments. *LWT - Food Sci Tech* 2007;40:49–57. [CrossRef]
- Barış Tuncel N, Yılmaz N. Kaz Dağları'ndan Toplanan Bazı Bitkilerin Fenolik Asit Kompozisyonlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde Belirlenmesi. *Akademik Gıda* 2010;8:18–23. Erişim: <http://www.academicfoodjournal.com/archive/2010/3/18-23.pdf>
- Kafarski P, Talma M. Recent advances in design of new urease inhibitors: A review. *J Adv Res* 2018;13:101–12. [CrossRef]
- Cheng JC, Dai F, Zhou B, Yang L, Liu ZL. Antioxidant activity of hydroxycinnamic acid derivatives in human low density lipoprotein: Mechanism and structure-activity relationship. *Food Chem* 2007;104:1:132–9. [CrossRef]
- Alam MA, Subhan N, Hossain H, Hossain M, Reza HM, Rahman MM, Ullah MO. Hydroxycinnamic acid derivatives: a potential class of natural compounds for the management of lipid metabolism and obesity. *Nutr Metab* 2016;13:27. [CrossRef]
- Kuczkowiak U, Petereit F, Nahrstedt A. Hydroxycinnamic Acid Derivatives Obtained from a Commercial *Crataegus* Extract and from Authentic *Crataegus* spp. *Sci Pharma* 2014;82:4:835–46. [CrossRef]
- Calik Z, Karamese M, Acar O, Aksak SK, Dicle Y, Albayrak F, et al. Investigation of *Helicobacter pylori* antigen in stool samples of patients with upper gastrointestinal complaints. *Braz J Microbiol* 2016;47:167–71. [CrossRef]
- Perumal S, Mahmud R, Ismail S. Mechanism of Action of Isolated Caffeic Acid and Epicatechin 3-gallate from *Euphorbia hirta* against *Pseudomonas aeruginosa*. *Pharmacogn Mag* 2017;13:S311–5. [CrossRef]
- Taofiq O, González-Paramás AM, Barreiro MF, Ferreira IC. Hydroxycinnamic Acids and Their Derivatives: Cosmeceutical Significance, Challenges and Future Perspectives, a Review. *Molecules* 2017;22:281. [CrossRef]